

*Les gestes
qui sauvent*

- Aurélia STAMM -

- Hélène LARQUÉ -

- Estelle GARCIA -

Les gestes qui sauvent

Principes de base

Contrôler ses émotions et apporter un soutien à la victime sans prendre de risque



4 étapes primordiales



Sécuriser le lieu de l'accident et les personnes impliquées



Apprécier l'état de la victime
(respiration, conscience)



Demandez de l'aide
-> 1 personne de plus
-> urgence vétérinaire




Effectuez les gestes de premier secours calmement

4 étapes primordiales

1

Sécuriser le lieu de l'accident et les personnes impliquées



4 étapes primordiales



Apprécier l'état de la
victime
(respiration, conscience)

4 étapes primordiales



 **Vet-Urgentys**
05 61 11 21 31 (7j/7)

 **URGENGE VÉTÉRINAIRE TOULOUSE**
By ADOMVET
05 32 09 39 90

Urgence et soins intensifs ENVT :
05 61 19 38 62





3

Demandez de l'aide :
-> 1 personne de plus !
-> urgence vétérinaire

4 étapes primordiales



Effectuez les gestes de
premier secours
calmement



Les grands syndromes

Les gestes qui sauvent

Il s'étouffe

Le reverse sneezing



<https://m.youtube.com/watch?v=u5R1n4U8gBM>

- Ne rien faire
- Fermer la gueule et boucher les narines une ou 2 secondes

Pas grave mais aller voir le véto
si c'est récurrent

Il s'étouffe

vraiment !



Signe avant coureur : agitation, se frotte le museau avec les pattes, yeux exorbités, muqueuses tournent au bleus (cyanose)
=> pas de respiration, toux, vocalise, garde la gueule ouverte.


Causes : présence d'un objet (● ...), absence d'oxygène (fumée ...)

Deux types d'obstruction : Partielle / **Totale**

Il s'étouffe **vraiment !**

Gestes :


1. **Dégager les voies aériennes**
 - un **corp étranger dans la gueule ??**
 - retirer le collier
 - position de dégagement des voies aériennes
 - traction de la langue
 - dégager la salive
2. Claque dans le dos (que si obstruction totale)
3. Compression abdominale



Les gestes qui sauvent

Il s'étouffe vraiment !

Gestes efficace :
→ reprise de la respiration



Allez voir le véto pour faire un check up
des voies respi


Pas efficace :
→ risque d'arrêt cardio
pulmonaire






Réanimation (cf suite)

Il saigne beaucoup

Hémorragies



points de compression direct ou a distance (main et/ou mouchoir)
-> maintient avec un lien large ou un garrot élastique



Les gestes qui sauvent

Il saigne beaucoup



Hémorragie interne ?

Intra-abdominale


Intra-thoracique

Intra-crânienne

...

On court chez le véto

Il est inconscient et respire



Appeler par le prénom

Taper dans les mains



Faire des bruits stimulants

Toucher sans brutaliser (moustaches peau)

Pincer la patte au niveau des coussinets

Absence de dilatation des pupilles à la lumière

Réflexe palpébral



Oreille à côté de la gueule
Mouvements respiratoires



Les gestes qui sauvent


Il est inconscient et respire

Le transporter

Tout seul



A deux



Mettre sur une surface dure si possible (surtout si trauma)



Tout en continuant à le surveiller !!

Et en pratique ?



Il est inconscient et ne respire pas

Absence de conscience
Absence de mouvements respiratoires

~~Palpation du pouls,
auscultation cardiaque~~

Pronostic neurologique : retour à la circulation spontanée dans les 15min
-> 80% de récupération complète

Commencer la réanimation
(en moins de 15secondes)

Il est inconscient et ne respire pas



Causes :

- Obstruction des voies aériennes
- Composition de l'air anormale (fumée...)
- Ventilation arrêtée

Signes : Arrêt des mouvements de la cage thoracique et de l'abdomen et aucune réponse aux stimulus impliquant une absence de conscience

Les gestes qui sauvent

Il est inconscient et ne respire pas



A : Airways sécuriser et ouverture des voies aériennes

B : Breathing : ventilation assistée

C : circulation : compression du coeur / thorax


Il est inconscient et ne respire pas

A : Airways sécuriser et ouverture des voies aériennes

Il s'étouffe vraiment !

Geste :

1. Dégager les voies aériennes
 - un corps étranger dans la gueule ??
 - retirer le collier
 - position de dégagement des voies aériennes
 - traction de la langue
 - dégager la salive
2. Claque dans le dos (que si obstruction totale)
3. Compression abdominale
4. Autre alternative



Il est inconscient et ne respire pas

 **B : Breathing** : ventilation assistée




Technique du bouche à truffe



Si vous ne voyez pas la cage thoracique se soulever c'est qu'il y a une **obstruction** !

Il est inconscient et ne respire pas

C : Circulation : compression du coeur / thorax



Il est inconscient et ne respire pas

 **C : Circulation : compression du coeur / thorax**

Chiens de grandes races et géants



Chiens avec thorax profond



Chiens avec thorax large




Chiens de petite taille



Il est inconscient et ne respire pas

 **C : Circulation : compression du coeur / thorax**



30 compressions
2 insufflations

jusqu'à ce que ça reparte



Compression sans arrêt
1 insufflation / 10 sec

jusqu'à ce que ça reparte



Sur le rythme de "staying alive"



Et en pratique ?



Il convulse



Convulsion = mouvements soudains incontrôlés dus à une perturbation de l'activité cérébrale (peut durer 3 à 5min)

Locale ou généralisée

Animal conscient ou non

+/- selles vomissements et urines

Causes : épilepsie, intoxication, troubles métaboliques, tumeur au cerveau ...

Il convulse



Réagir :

- éviter que l'animal se blesse : éloigner les objets dangereux l'empêcher de tomber ...
- éloigner le max de monde : l'animal peut devenir agressif
- mettre dans un endroit sombre et calme : son et lumière peuvent relancer les crises
- protégez-vous pour éviter les morsures
- chronométrez la durée de la crise

si > 3 min : refroidir les oreilles le ventre
et les pattes à l'eau fraîche mais pas
trop froide

si > 2-3 crises /24h

→ Aller voir un véto ←

Les gestes qui sauvent

Il convulse




- Ne pas mettre les mains à proximité de la gueule
- Ne pas chercher à stopper la crise (tapes sur le chien stimulus quelconque) : elle s'arrêtera d'elle-même et c'est impossible de la stopper

Les gestes qui sauvent

Il a une plaie superficielle

Manip avec des gants si possible (zoonoses)



Couper les poils



Compresse avec bétadine diluée




A l'air libre (colerette)
ou pansement simple

+ surveillance journalière : rougeur, chaleur, gonflement, douleur -> infection probable = vétérinaire


Il a une plaie grave

Risque d'infection ++ : gestion de la plaie par un vétérinaire

- empêcher l'animal de se lécher et se gratter
- surveiller les hémorragies associées
- surveiller les fonctions vitales
- ne pas retirer soi-même les corps étrangers inclus dans la plaie




Si plaie à l'oeil on vas chez le véto sans trop toucher



Les gestes qui sauvent

Il est brûlé



Cause :

- chaleur : goudron l'été
- substance chimique
- frottement
- électricité ...

Les gestes qui sauvent

Il est brûlé



1

Refroidir la zone touchée : de l'eau froide courante (pendant 20-30min dans les 2h)



Eau >3°C et pas de glaçons

2

Attendre que ça sèche

3

Puis pommade grasse pour brûlure (biafine) protégée par un pansement

Si brûlure étendue :

Refroidir pendant 5 min à l'eau froide (/\ à l'hypothermie), couper les poils et aller chez le véto.

Et en pratique ?



Il a un trauma



Traumatisme crânien (ou cervical)

Cause principale : les accidents de la route 



Le reconnaître :

Signes généraux :

- Perte de conscience ou confusion
- Désorientation ou agitation
- Léthargie excessive ou somnolence
- Saignements de nez ou d'oreilles
- Convulsions ou tremblements
- Vomissements ou diarrhée

Changements soudains de comportement

Signes spécifiques liés au traumatisme :

- Déformation du crâne, plaies ouvertes ou saignements
- Pupilles dilatées, asymétriques ou non réactives à la lumière
- Perte d'équilibre ou difficultés à marcher
- Perte de sensibilité ou de motricité

Il a un trauma

Traumatisme crânien (ou cervical)



Réagir :

Sécuriser les lieux

- Eviter au max de déplacer l'animal !

Premiers secours

- Respiration ?
- Conscience ?
- Compresse froide sur la zone d'impact.
- **Ne lui donnez ni nourriture ni eau.**

Appel d'urgence : contacter immédiatement un vétérinaire

=> Préparez les info essentielles : l'heure de l'accident, le type de blessure, l'état actuel de votre chien.

Prévenir les trauma :

- /!\ travaux routiers, chantiers
- Surveiller les activités de votre chien (jeux, escaliers).
- /!\ sécurité routière



Il a un trauma



Fractures, blessure musculaire ou articulaire



Forte douleur
Gonflement
Boiterie
+/- Plaie ouverte



Immobiliser l'articulation en amont et en aval
=> Faire une atelle



Les gestes qui sauvent

Il a un trauma

Fractures, blessure musculaire ou articulaire



Véto...

Un usage non maîtrisé des anti-inflammatoires
= intoxication et lésions rénales





*Particularités
du chien*


Le coup de chaleur



Qu'est ce que c'est ?

Un coup de chaleur correspond à une **élévation de la température corporelle**


=> **hyperthermie > 40,5°C**



Les signes

- Augmentation de la fréquence respiratoire, halètements
- Salivation importante
- **Difficultés respiratoires** (le chien a du mal à trouver son air)
- **État d'agitation** qui alterne avec un état d'**abattement et une prostration**
- **Baisse de la vigilance**
- Difficultés motrices qui peuvent se manifester par une **démarche titubante**
- +/- perte de connaissance et/ou l'apparition de convulsions.

Urgence vitale !



Le coup de chaleur

Réagir !




Appeler le véto puis en attendant :


1) Mettre le chien dans un endroit frais

2) Rafrâchir très progressivement :

- **Ne surtout pas plonger le chien dans un bain d'eau froide !**
- Appliquer un linge frais et humide sur corps pendant 5 min
- Puis **douchez** à l'eau fraîche mais **pas trop froide** pendant 10 min
- Proposez lui à boire




Sur le trajet pour aller chez le véto :
placer le chien sur un linge frais et humide




Le coup de chaleur

Prévention !

- **Ne jamais laisser le chien dans un endroit fermé et très chaud** : voiture, coffre de voiture
- Lors de trajet en voiture mettre clim/ouvrir les fenêtres + pose toutes les 2h
- Activité physique jamais trop intense
- Lors de promenade, apportez bouteille d'eau et bol ou gourde pour chien
- Lors de températures extrêmes : éviter les heures les plus chaudes



Le retournement d'estomac



Prédispositions : grandes races à cage thoracique profonde

Reconnaitre :


- anxiété
- efforts vomitifs sans succès
- distention abdominale
- palpation abdominale douloureuse
- muqueuses pales
- pouls faible




Urgence vitale ! Le chien risque un choc décompensé

Les gestes qui sauvent

Le retournement d'estomac




Pour info : Sondage, trocardage = premiers geste réalisés par le véto



Puis procédure chirurgicale souvent indispensable

Le retournement d'estomac



Prévenir :

- Eviter les efforts intenses après les repas
- Fractionner les repas
- Avoir un petit chien ...

Les chenilles processionnaires

Signes évocateurs à reconnaître immédiatement :

- Gonflement des babines
- Salivation abondante
- Toux
- Vomissements
- Votre chien se frotte les babines et le museau
- Inflammation des zones de contact




Urgence vitale ! Le chien risque une nécrose de la langue



Les chenilles processionnaires

Urgence vitale !

Il faut **agir vite** MAIS **chenilles = danger pour l'homme** aussi



Protégez vous et ne vous mettez pas en danger :

Ne pas toucher les chenilles !

Mettre des gants (jardinage) si à disposition





- **Rincer abondamment la gueule** (dedans et en dehors) de votre chien avec de l'eau afin de débarrasser un maximum de poils urticants responsables de la réaction
- **NE PAS FROTTER** les zones affectées, cela pourrait casser les poils et donc aggraver les symptômes.
- Amener le chien chez le **vétérinaire rapidement**



Les gestes qui sauvent

Intoxication

Causes variées :






Les gestes qui sauvent

Intoxication

Signes évocateurs :

- perte d'appétit
- maux de ventre
- diarrhée
- vomissements
- hyper-salivation
- fièvre
- tremblements
- convulsions
- coma



Intoxication

Réagir !

N°1



Amener le chien chez le véto

Penser à amener le toxique (sachet, restes ...)




Ne pas faire vomir !

Sauf si sûr qu'il a ingéré du **chocolat** dans l'heure
+ validation par véto au téléphone



Donnez-lui environ une cuillère à café de **peroxyde d'hydrogène (3 %)**.
Mélangez-la avec de **l'eau** en suivant un ratio de 50-50



Les gestes qui sauvent

Un corp étranger

L'épillet

Saison : printemps / été

Prédisposition : chien à poils longs mais **tous concernés**

Ca s'attrape en ballade et ça peut rentrer par tous les orifices (oreilles, nez, vulve, oeil ...) + traverser la peau (coussinets ...)

-> **Inflammation, infection, fistules**

Signes évocateur : chien qui se gratte, éternue, secoue la tête ...



Un corp étranger

L'épillet

Réagir : **Urgence vétérinaire relative (localisation ...)**

1. Analyser la position de l'épillet
2. Est-ce que je peux m'en occuper ou je vais chez le véto ?
3. Le retirer : utiliser une pince fine et attention à bien le tenir par la pointe (au risque de n'en retirer que la moitié...), faire des gestes lents et contrôlés
4. Désinfecter la zone et surveiller ddans les jours qui suivent



Prévenir : inspecter le pelage et les zones critiques après chaque ballades à risque (été, hautes hebres ...)

Les gestes qui sauvent


Un corp étranger

Ingestions en tout genre...



Signes évocateurs :

- perte d'appétit
- maux de ventre
- vomissements
- hyper-salivation




Réagir selon l'objet ingéré :

- attendre ?
- chirurgie nécessaire ?




Demandez conseil à un vétérinaire



Sources

- “Les gestes qui sauvent, le guide” croix-rouge française
- <https://www.slideserve.com/koren/le-secourisme-canin>
- <https://www.lepointveterinaire.fr/publications/le-point-veterinaire/article-canin/n-384/gestion-des-brulures.html>
- <https://www.alforme.fr/page/etouffement-chien-et-chat-70>
- https://www.direct-vet.fr/ressources/Manuel_Premiers_Secours.pdf
- Lacoste, C. (2024). Comment reconnaître et traiter une intoxication aux chenilles processionnaires chez le chien ? (Unpublished master's thesis). Université de Liège, Liège, Belgique. Retrieved from <https://matheo.uliege.be/handle/2268.2/19446>
- Yaich, H., Malek, A. et Malek, A. (2023). Intoxication du Chien par le Raisin : Diagnostic et Prise En Charge. Le Nouveau Praticien Vétérinaire - Canine & féline, . 20(1), 60-63. <https://doi.org/10.1051/npvcafe/2022078>.
- BAKROU, A., & ALLOU, A. R. (2018). LA CONDUITE A TENIR DEVANT LES URGENCES RESPIRATOIRES CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT (Doctoral dissertation, université ibn khaldoun TIARET).
- <https://www.assurancesantechien.com/traumatisme-cranien-protocole->
- Comment soigner un chien qui a mangé du chocolat, Wiki How
- Comment agir lorsque mon chien est victime d'une intoxication ?, mon chien et moi
-





Merci!!